

# HAND-VOET HUIDREACTIE

*M. Daem*

*C. Lannoo*

*S. De Weggheleire*

## *Hand voet huidreactie*



Conway, 2010



## *Hand voet huidreactie*

Chiriac et al, 2017



## *Hand voetsyndroom*



Inokushi et al,  
2014



## *Hand-voet huidreactie*

- Regorafenib (60%), axitinib (29%), sorafenib (34%), sunitinib (19%)
- Treedt na 2-4 weken op
- Erytheem, pijn, afschilfering, blaren, paresthesie
- Dosis- en behandelduurafhankelijk
- Prognostische factor
- Impact QoL

## ***Hand-voet huidreactie***

### **Preventie!**

- Screening plantaire hyperkeratose
- Topisch exfoliërende producten  
(eeltzalf: salicylzuur 4g, benzoëzuur 3g, lanoline 7g, vaseline 8g)
- Podoloog
- Ureum 10% (Ren et al, 2015)
- Bescherming drukgevoelige zones (schoeisel, katoenen sokken, voeten goed drogen na baden, klemmende juwelen, drukpunten beschermen, zoutbad,...)



## *Hand-voet huidreactie*

### Behandeling

- Xerial: ureum in hoger dosering geeft exfoliërend, keratolytisch en hydraterend effect (scrub effect)  
Ureum in lage dosering geeft hydraterend effect
- Salicylzuur/ureum enkel op hyperkeratose (cave: ulceratie)
- Pijnstilling
- Evaluatie na 7-14dagen



Graad 1



Graad 2



Graad3















